

## 2. Impfkalender aller allgemein empfohlenen Impfungen

### Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓Impfung	1. Lebensjahr							2. Lebensjahr					3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr		
	7. Wo	3. Mo	5. Mo	6. Mo	7. Mo	11. Mo	12. Mo	13. Mo	14. Mo	15. Mo	16. Mo	20.-24. Mo						
<b>Rotavirus (RV)</b>	RV 2 bzw. 3 Dosen, abhängig vom verwendeten Impfstoff, Abstand mind. 4 Wochen																	
<b>Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Polio-myelitis (IPV) Haemo-philus infl. B (HiB) Hepatitis B (HBV)</b>		1. 6-fach Impfung	2. 6-fach Impfung					3. 6-fach-Impfung frühestens 6 Monate nach 2. Teilimpfung										
<b>Pneumo-kokken (PNC)</b>		1. PNC	2. PNC					3. PNC frühestens 6 Monate nach 2. Teilimpfung										
<b>Mumps Masern Röteln (MMR)</b>							MMR 2 Impfungen, Abstand mind. 4 Wochen					MMR nachholen						
<b>Menin-gokokken B<sup>1</sup></b>		Men B 3 Dosen, Abstand mind. 1 Monat						4. Men B										
<b>Menin-gokokken C<sup>2</sup></b>								MEC-C 1 Impfung ab vollend. 1. Lebensjahr										
<b>FSME</b>								1. FSME	2. FSME			3. FSME				FSME		
<b>Vari-zellen (VZV)</b>								VZV 2 Impfungen, Abstand mind. 4 Wochen Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen										
<b>Hepatitis A (HAV)</b>								HAV 2 Impfungen, Abstand mind. 6 Monate										
<b>Influenza (IV)<sup>3,4</sup></b>							IV jährlich											

  Kostenfrei

  Nicht kostenfrei

<sup>1</sup>Bei späterem Impfbeginn: Impfschema im einschlägigen Kapiteln ab Seite 33ff.

<sup>2</sup>MEC-C: konjugierter Men-C Impfstoff bei Erstimpfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat nur eine Dosis (kann ab dem vollendeten 2. Lebensmonat erstmals geimpft werden, dann 2 Dosen im Abstand von mind. 8 Wochen).

<sup>3</sup>IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum vollendeten 8. Lebensjahr) 2 Impfungen mit mind. 4 Wochen Abstand empfohlen.

<sup>4</sup>Ab vollendeten 2. Lebensjahr nasaler Influenza-Lebendimpfstoff

## Schulkinder und Jugendliche

Alter→ ↓ Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr	16. Jahr	17. Jahr
<b>Diphtherie (dip)</b> <b>Tetanus (TET)</b> <b>Pertussis (PEA)</b> <b>Poliomyelitis (IPV)</b>	4-fach- Imp- fung	nachholen bei Kindern, die im 7. Lebens- jahr nicht geimpft wurden					1				alle 10 Jahre auffrischen
<b>Hepatitis B (HBV)</b>		Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder auffrischen									gegebenenfalls nachholen
<b>Mumps</b> <b>Masern (MMR)</b> <b>Röteln</b>	MMR nachholen										
<b>Humane Papillo- maviren (HPV)<sup>2</sup></b>				2 x HPV (0/6 Monate)			2 x HPV <sup>3,4</sup> (0/6 Monate)			gegebenenfalls nachholen	
<b>Varizellen (VZV)</b>	VZV nachholen										
<b>FSME</b>				FSME					FSME		
<b>Meningokokken<sup>5</sup> (MEC-4)</b>					MEC-4						
<b>Influenza (IV)</b>	IV jährlich										

<sup>1</sup>Kinder, die im 7.-9. Lebensjahr nur eine dip-Tet-IPV-Impfung erhalten haben, sollen spätestens bei Schulaustritt eine Impfung mit einer Pertussiskomponente erhalten.

<sup>2</sup>Die HPV Impfung im 1+1 Schema soll so früh wie möglich ab dem vollendeten 9. Lebensjahr begonnen werden.

<sup>3</sup>Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis.

<sup>4</sup>Empfehlung für das 15. Lebensjahr stützt sich auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, WHO:

<http://www.who.int/entity/wer/2014/wer8943.pdf?ua=1>; abweichend von der derzeit gültigen Fachinformation für den tetravalenten Impfstoff.

<sup>5</sup>Nachholchema für MenB: Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

Kostenfrei       Nicht kostenfrei

## Erwachsene

Erwachsene mit vorliegender Grundimmunisierung gemäß den Empfehlungen \*

Alter→ ↓ Impfung	18.-20. Jahr	30. Jahr	40. Jahr	50. Jahr	60. Jahr	65. Jahr	70. Jahr	75. Jahr	80. Jahr usw.	
<b>Diphtherie (dip)</b> <b>Tetanus (TET)</b> <b>Pertussis (PEA)</b> <b>Poliomyelitis (IPV)</b>	alle 10 Jahre auffrischen				alle 5 Jahre auffrischen					
<b>Hepatitis B (HBV)</b>	gegebenenfalls nachholen									
<b>Humane Papillomaviren (HPV)</b>	gegebenenfalls nachholen									
<b>Mumps</b> <b>Masern (MMR)</b> <b>Röteln</b>	gegebenenfalls nachholen									
<b>FSME</b>	alle 5 Jahre auffrischen				alle 3 Jahre auffrischen					
<b>Pneumokokken</b>	siehe Kapitel Pneumokokken									
<b>Herpes Zoster (HZV)</b>	einmalige Gabe									
<b>Varizellen (VZV)</b>	bei seronegativen Personen ggf. nachholen									
<b>Influenza (IV)</b>	IV jährlich									

\* Für Personen, bei denen die Grundimmunisierung ganz oder teilweise fehlt, siehe auch Kapitel „Nachhol-Empfehlungen“.

**Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfung bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden.**  
Sollte die Impfung nicht im empfohlenen Schema aller hier angeführten Tabellen durchgeführt werden,  
so wird auf das Kapitel „Nachholimpfungen“ verwiesen.